



تعميم

بشأن التدخلات الوقائية للأمراض المعدية

الموقرين

السادة مشتركي غرفة جدة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد،

إشارة إلى خطاب اتحاد الغرف التجارية السعودية، المبني على خطاب هيئة الصحة العامة "وقاية" والمشار فيه إلى قيام الهيئة بدراسة التدخلات الوقائية للأمراض المعدية التالية المكورات النيسيرية السحائية وفيروس المخلوي التنفسي وفيروس الانفلونزا، وتوصي بما يلي:

أولاً/ التوصيات المتعلقة بلقاح المكورات السحائية من المجموعة المصلية ب (MenB):

توصي الهيئة بإعطاء لقاح المكورات النيسيرية السائحة من المجموعة المصلية ب (MenB) لفئات محددة معرضة

لخطر الإصابة بسبب حالتهم الصحية أو بسبب تزايد خطر تعرضهم للميكروب والتي تشمل الآتي:

• المرضى الذين يعانون من ضعف وظيفي في الطحال (مثل مرضى الأنيميا المنجلية) أو الذين أجرى لهم

استئصال الطحال.

• المرضى الذين يعانون من نقص أو غياب مكونات الجهاز المكمل (Complement Deficiency).

• المرضى الذين يخضعون لعلاجات مثبطة لمكونات الجهاز المكمل (Complement inhibitors) مثل

إيكوليزوماب (eculizumab) أورافوليزوماب (Ravulizumab).

• الأطفال بعد التعافي من مرض التهاب السحايا النيسيرية وذلك بعد تقييمهم من قبل الطبيب المعالج.

• العاملين الصحيين في المختبرات الذين يتعاملون مع عزل المكورات السحائية النيسيرية.

• الأشخاص المعرضين للإصابة أثناء حدوث تفشي للمكورات السحائية النيسيرية المجموعة المصلية ب.

كما توصي بإعطائهم ثلاث جرعات ثلاث جرعات من اللقاح للفئات الموضحة أعلاه، الجرعة الثانية بعد شهرين من

الجرعة الأولى والجرعة الثالثة بعد ستة أشهر، مع إمكانية إعطاء جرعات تنشيطية بحسب تقييم الطبيب المعالج

لكل حالة.

اسم اللقاح: (4CMenB) للفئة العمرية شهرين فأكثر (MenB-FHBP) للفئة العمرية عشرة سنوات فأكثر.



ثانياً / فيما يخص التوصيات المتعلقة بلقاحات الفيروس المخلوي التنفسي (RSV) للبالغين الأكبر سناً:

توصي الهيئة بتطعيم الأشخاص في الفئة العمرية 60 عام وأكبر ولديهم إحدى عوامل الخطورة الموضحة أدناه

بلقاح الفيروس التنفسي المخلوي بجرعة واحدة إذا لم يتلقوا اللقاح من قبل وذلك للفئات التالية:

- أمراض القلب المزمنة (مثل فشل القلب).
- أمراض الكلى المزمنة.
- مرض السكري.
- أمراض الكبد المزمنة (مثل تلف الكبد).
- سكان مرافق الرعاية طويلة الأجل.
- أمراض الرئة أو جهاز التنفسي المزمنة (مثل الانسداد الرئوي المزمن والربو).
- حالات ضعف المناعة المتوسطة إلى الشديدة.
- أمراض الدم المزمنة (مثل الأنيميا المنجلية والثلاسيميا).
- السمنة المفرطة (مؤشر كتلة الجسم ك 40 كجم/م²).
- جميع البالغين بعمر 75 سنة وأكثر.
- الأمراض العصبية المزمنة أو الاضطرابات العصبية العضلية التي تؤثر على مجرى التنفس أو عضلات الجهاز التنفسي.

كما توصي بتطعيم الأشخاص في الفئة العمرية 50 إلى 59 سنة ولم يتلقوا اللقاح من قبل ولديهم إحدى عوامل الخطورة المشار إليها أعلاه بناءً على التقييم وتوصية الطبيب المعالج.

ثالثاً / التوصيات المتعلقة بلقاح الانفلونزا الثلاثي ومقارنته بلقاح الانفلونزا الرباعي:

توصي الهيئة بأفضلية استخدام لقاح الانفلونزا الثلاثي بدل من لقاح الانفلونزا الرباعي، وذلك نظراً لعدم رصد سلالة Yamgata عالمياً أو محلياً ولعدم ارتباطها بتفشيات مؤكدة لفيروس الانفلونزا، وكما توصي بأفضلية استخدام لقاح الانفلونزا الثلاثي عالي الجرعات للأشخاص في الفئة العمرية 65 سنة وأكبر بدل من لقاح الانفلونزا عالي الجرعات الرباعي، مع أهمية استمرار تقييمها سنوياً نظراً للطبيعة المتغيرة لسلالات الانفلونزا واستناداً إلى مستجدات بيانات الترصد الوبائي المحلي والعالمي.

عليه نأمل من جميع المنشآت الصحية الاطلاع والالتزام بالتوصيات المذكورة أعلاه.

وتقبلوا اطيب تحياتنا وتقديرنا،،



مدير إدارة التسويق والتواصل المؤسسي المكلف

